

	Neurochirurgie	pathologie	Frequentie gebruik ICU, personeel, produkten (0 tot 10)	duurtijd belasting ICU personeel, produkten (0 tot 10)	Duurtijd belasting klassieke hospitalisatie (0 tot 10)
	SPECIALITEIT NEUROCHIRURGIE				
Urgentiegraad 1°	onmiddellijk, acuut, levens-, orgaan- of lidmaatbedreigend	<u>PATHOLOGIE*</u> Intracranieële overdruk, coma. Snel evolutieve neurologische deterioratie. Medullaire acuut opgetreden uitval door compressie. Traumatologie. Intracranieële hematomen. Intracranieële massa's met risico op inklemming. Acute hydrocefalie. Maligne CVA. Infectie (meningitis) Abces. Ruggenmergcompressie door spinale fracturen, hematomen, tumoren Lumbale discushernia met cauda equina. <u>INTERVENTIES**</u> Trepanatie.	10 10 10	10 10 2	10 10 10

		Cerebrale intracraniële drukmeting - liquordeviatie. Spinale decompressie en stabilisatie al dan niet geïstrumenteerd.			
Urgentiegraad 2°°	acut, deteriorerend, mogelijk levens-, orgaan of lidmaatbedreigend interventie in orde van uren	<u>PATHOLOGIE</u> Pathologie van urgentiegraad 1 maar die traag evolutief is of relatief stabiel zonder coma. Cerebrale aneurysmata geruptureerd . Gebloed AVM. Hypofysaire apoplexie Radiculaire uitval door lumbale of cervicale hernia. Instabiele spinale fracturen al dan niet met beperkt deficit. Geïnfekteerde implantaten. Open perifere zenuw en plexus traumatologie. Diagnostische ingrepen voor opstarten therapie : art temp biopt / spierbiopt. Spina bifida aperta. <u>INTERVENTIES</u> Trepanatie – stereotaxie Transsphenoïdale ingrepen ** (speciale voorzorgen !!)	10 10 10 10 2 2 1 1 0 10	10 10 10 10 2 2 1 1 0 2	10 7 7 7 3 5 3 0 5

	Gelet op geringe impact op gezondheid uitstelbaar zonder onmiddellijke planning >3md	<p>weerslag hebben op het dagelijks functioneren.</p> <p>Epilepsie. 10</p> <p>End of life Pulse generator . 0</p> <p>Perifere zenuw pathologie met weerslag op het dagelijks functioneren. 0</p> <p>Hypofhyse pathologie met enkel endocriene weerslag.</p> <p>B.</p> <p>Dystonie- tremor DBS 10</p> <p>Nieuwe intake neuromodulatie pain. 0</p> <p>Wervelkolom deformatie – scoliose. 8</p> <p>Aangeboren of verworpen te corrigeren schedeldeformatie. 8</p> <p><u>INTERVENTIES</u></p> <p>Trepanatie – stereotaxie</p> <p>Transspheenoïdale ingrepen ** (speciale voorzorgen !!)</p> <p>Liquordeviatie.</p> <p>Spinale heelkunde al dan niet met instrumentatie.</p> <p>Neuromodulatie systemen.</p> <p>Spinale denervaties.</p> <p>Neurolyse</p>			
--	--	---	--	--	--

Voorbehoud: deze lijst is een oriënterende en ondersteunende lijst. Er is een blijvende verantwoordelijkheid van de clinicus die moet rekening houden met de specificiteiten (bv comorbiditeiten) van de patiënt én met de actuele en voorspelde capaciteit en veiligheidscontext van het ziekenhuis. De flexibiliteit van reconversie van capaciteit in het kader van mogelijke COVID- 19 heropflakkingen, moet in rekening gebracht worden (zie antwoord uitgebreid Bureau Hoge Raad Artsen d.d. 19.04.2020).

Het voorstel veronderstelt het openstellen consultaties mits garanties voor alle veiligheidsmaatregelen (inclusief registry van beschikbare middelen).

Tele-consultaties worden gestimuleerd, ondermeer voor triage en verwijzingen door HA voor patiënten met onduidelijke klachten

Uitleg bij de tabel:

*PATHOLOGIE hier telkenmale voor uw Specialiteit een niet limitatieve lijst van specifieke aandoeningen of pathologie groepen indien mogelijk liefst in volgorde van frequentie van voorkomen.

**INTERVENTIES betreft alle diagnostische en therapeutische tussenkomsten al dan niet met noodzaak tot narcose

° Urgentiegraad 1:

Betekent urgentie in die mate dat de diagnostische uitwerking en behandeling voorrang heeft op alle andere activiteit die desnoods hiervoor wordt stilgelegd (onmiddellijk)

°°Urgentiegraad 2:

Betreft elke diagnostische of therapeutische tussenkomst die van zodra mogelijk en binnen programma moet kunnen doorgaan. Het bestaande dagschema kan desnoods worden aangepast of verlengd (zelfde dag)

°°° Urgentiegraad 3:

Betreft diagnostische of therapeutische handelingen die zo snel mogelijk moeten worden gepland op korte termijn (<1week)

+ Electief A

Diagnostische en therapeutische handelingen die leiden tot een plan van aanpak van de ziekte eventueel in stappen maar zo te plannen dat er geen kans vermindering voor de patiënt volgt, rekening houdende met de capaciteit van het ogenblik (met voorrang de Urgentiegraden 1, 2 en 3)

Afwerking in te schatten en noodzakelijk <3 maanden

++ Electief B

Diagnostische en therapeutische handelingen die niet bedreigend zijn voor de gezondheid op korte of middellange termijn.

Kunnen gezien worden voor advies zonder dat concrete planning mogelijk is binnen periode 3 maanden.

Kunnen wel doorgaan in geval van overcapaciteit in de gezondheidsinstellingen.

Wat betreft de kolommen "frequentie" en verwachte "duurtijd" in het gebruik van de ICU en hospitalisatie duur zal ad hoc in parallel door de hoofddarts in overleg de praktische uitwerking moeten worden vastgesteld naar gelang de mogelijkheden.

De enquête peilt enkel naar een score tussen 0 en 10 om een en ander duidelijker in beeld te brengen.